

## FOGLIETTO ILLUSTRATIVO:

# Scalibor Protectorband

## collare antiparassitario per cani - 48 cm

- 1. NOME E INDIRIZZO DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE**  
**ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO E DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE ALLA PRODUZIONE RESPONSABILE DEL RILASCIO DEI**  
**LOTTI DI FABBRICAZIONE, SE DIVERSI**  
Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio:  
 MSD Animal Health S.r.l.  
 Via Fratelli Cervi snc  
 Centro Direzionale Milano Due, Palazzo Canova  
 20090 Segrate (Milano)

Produttore responsabile del rilascio dei lotti di fabbricazione:  
 Intervet International B.V.  
 Wim de Körverstraat 35  
 5830AA – Boxmeer (Olanda)  
**oppure**  
 Intervet Productions S.A.  
 Rue de Lyons  
 27460 Igoville (Francia)

- 2. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE VETERINARIO**  
 Scalibor Protectorband 48 cm collare antiparassitario per cani.

- 3. INDICAZIONE DEL(I) PRINCIPIO(II) ATTIVO(II) E DEGLI ALTRI INGREDIENTI**  
 Un collare bianco da 48 cm contiene:  
**Principio attivo:**  
 Deltametrina 0,760 g  
**Eccipienti:**  
 Biossido di titanio (E171) 0,285 g

- 4. INDICAZIONE(I)**  
 Ectoparassiti del cane sensibili alla deltametrina:  
  - prevenzione delle infestazioni da zecche per 6 mesi;
  - prevenzione delle infestazioni da pulci per 4 mesi;
  - effetto repellente sulle zanzare adulte (*Culex pipiens pipiens*) per 6 mesi.
 Il trattamento fornisce un effetto repellente nei confronti dei flebotomi (*Phlebotomus perniciosus*) per 12 mesi.

**L'effetto repellente (anti-feeding) di SCALIBOR nei confronti dei flebotomi consente inoltre di ridurre il rischio di trasmissione di leishmaniosi viscerale nel cane.**

**Scalibor può quindi essere considerato come parte di un programma di prevenzione dell'infezione da *Leishmania infantum*.**

Poiché il prodotto non ha un'azione repellente classica nei confronti delle zecche, è possibile osservare la presenza di zecche anche dopo l'applicazione del collare. I parassiti muoiono una volta esposti al principio attivo presente sul cane. L'assunzione di quantità tossiche porta ad ipereccitazione seguita da paralisi e morte. Di conseguenza, è poco probabile che le zecche possano completare il pasto di sangue.

- 5. CONTROINDICAZIONI**  
 Non utilizzare nei cani con nota ipersensibilità al principio attivo.  
 Non utilizzare nei cuccioli di età inferiore a 7 settimane.  
 Non utilizzare nei gatti.  
 Non utilizzare il collare in animali che presentino lesioni cutanee estese.

- 6. REAZIONI AVVERSE**  
 Sono state segnalate reazioni cutanee locali (prurito, eritema, perdita di pelo), che hanno

interessato il collo o la cute in generale e che possono essere indicative di una reazione di ipersensibilità generale o locale, in casi rari.

Sono state segnalate alterazioni del comportamento (ad esempio letargia o iper-reattività) spesso associate ad irritazione cutanea, in casi molto rari.

Sono stati osservati sintomi gastrointestinali come vomito, diarrea e ipersalivazione in casi molto rari.

Sono stati osservati problemi neurologici come atassia e tremori muscolari in casi molto rari.

Di solito i sintomi scompaiono entro 48 ore dalla rimozione del collare.

Se si osserva uno di questi sintomi, rimuovere il collare. Il trattamento è sintomatico poiché non sono noti antidoti.

La frequenza delle reazioni avverse è definita usando le seguenti convenzioni:

- molto comuni (più di 1 su 10 animali trattati manifesta reazioni avverse durante il corso di un trattamento)
- comuni (più di 1 ma meno di 10 animali su 100 animali trattati)
- non comuni (più di 1 ma meno di 10 animali su 1.000 animali trattati)
- rare (più di 1 ma meno di 10 animali su 10.000 animali trattati)
- molto rare (meno di 1 animale su 10.000 animali trattati, incluse le segnalazioni isolate).

Se dovessero manifestarsi reazioni avverse gravi o altre reazioni non menzionate in questo foglietto illustrativo, si prega di informarne il veterinario.

- 7. SPECIE DI DESTINAZIONE**  
 Cane.

- 8. POSOLOGIA PER CIASCUNA SPECIE, VIA(E) E MODALITA' DI SOMMINISTRAZIONE**

Utilizzare 1 collare per soggetto.

Il collare deve essere preferibilmente applicato 1 settimana prima che gli animali vengano introdotti in un ambiente infestato, in quanto la piena attività viene raggiunta dopo 1 settimana.

Si raccomanda di trattare tutti i cani presenti nello stesso ambiente.

Il bagno non pregiudica l'efficacia del collare.

Il collare può essere utilizzato nei cuccioli di età superiore a 7 settimane.

- 9. AVVERTENZE PER UNA CORRETTA SOMMINISTRAZIONE**

Regolare il collare attorno al collo dell'animale senza stringerlo.

Tagliare la parte eccedente, lasciandone 5 cm dal fermaglio.

- 10. TEMPO(I) DI ATTESA**

Non pertinente.

- 11. PARTICOLARI PRECAUZIONI PER LA CONSERVAZIONE**

Conservare a temperatura inferiore a 25°C.

- 12. AVVERTENZE SPECIALI**

Precauzioni speciali per l'impiego negli animali:

In caso di irritazione locale marcata o di reazione allergica, rimuovere immediatamente il collare.

Precauzioni speciali che devono essere adottate dalla persona che somministra il medicinale veterinario agli animali:

Lavarsi le mani con acqua fredda e sapone dopo aver applicato il collare.



**MSD**

Animal Health

Non permettere ai bambini di giocare o di mettere in bocca il collare.  
Evitare il contatto con gli occhi o la bocca.  
Se il collare viene in contatto con gli occhi, sciacquare abbondantemente con acqua.  
Le persone con sensibilità nota alla deltametrina o ad altri componenti del collare devono evitare il contatto col prodotto.  
Se l'irritazione oculare o cutanea dovesse persistere, o se il prodotto venisse accidentalmente ingerito, rivolgersi immediatamente al medico mostrandogli il foglietto illustrativo.  
I cani trattati non devono dormire a contatto con le persone, in particolare con i bambini.  
Anche se il contatto occasionale con l'acqua non riduce l'efficacia del collare, quest'ultimo dovrebbe essere rimosso prima di un bagno o prima di una nuotata del cane in quanto il principio attivo è nocivo per i pesci e per gli altri organismi acquatici.  
I cani non devono entrare in acqua per i primi 5 giorni dopo l'applicazione del collare.

**Gravidanza e allattamento:**

Nessuna reazione avversa è stata osservata in cagne gravide a cui era stato applicato il collare durante tutto il periodo della gravidanza e dell'allattamento. Nessun sintomo è stato osservato nei cuccioli nati da tali cagne fino allo svezzamento.

**Sovradosaggio (sintomi, procedure d'emergenza, antidoti):**

In caso di ingestione accidentale del collare da parte del cane, si possono osservare i seguenti sintomi: incoordinazione dei movimenti, tremori, ipersalivazione. Tali sintomi sono reversibili nell'arco di 48 ore. Il trattamento può essere solo sintomatico, poiché non sono noti antidoti specifici.

**13. PRECAUZIONI PARTICOLARI DA PRENDERE PER LO SMALTIMENTO DEL PRODOTTO NON UTILIZZATO O DEGLI EVENTUALI RIFIUTI**

I medicinali non devono essere smaltiti attraverso le acque di scarico o i rifiuti domestici.

Chiedere al proprio veterinario come fare per smaltire i medicinali di cui non si ha più bisogno. Queste misure servono a proteggere l'ambiente.

Questo prodotto medicinale veterinario è pericoloso per i pesci e altri organismi acquatici. Non contaminare laghi, corsi d'acqua o fossati col prodotto o il confezionamento.

**14. DATA DELL'ULTIMA REVISIONE DEL FOGLIETTO ILLUSTRATIVO**

Ottobre 2018